

## Beleegyező nyilatkozat - rögzített fogpótlások

### A beavatkozás menete

Az alapos tervezés után a beavatkozás első lépéseként a pillérfogakat megfelelő érzéstelenítés mellett előkészítjük. A fogakat gyémántcsiszoló segítségével kónuszosra és egymással párhuzamosra preparáljuk úgy, hogy a készülő fogpótlás anyagától függően 1,5–2,5 mm-t eltávolítunk a fog felületéről. A hibás részeket ún. csonkfelépítővel kijavítjuk, majd az így előkészített fogakat tartalmazó és a vele szemben levő állcsonttól is lenyomatot veszünk. Végül rögzítjük az állcsontok egymáshoz való viszonyát, és meghatározzuk a fogpótlás színét. A fogtechnikus ezen információk alapján egy vagy több próba közbeiktatásával elkészíti a fogpótlást, ami kipróbálás után beragasztással kerül a végleges helyére.

### A rögzített fogpótlás közben előforduló leggyakoribb komplikációk, szövődmények:

#### Érzékenység, fogfájás

A preparálás, illetve a beragasztást követő napokban fokozott hideg-meleg érzékenység, enyhe fájdalom felléphet. Ha a fájdalom nem szűnik, vagy intenzív éjszakai fogfájás (lüktetés) jelentkezik, akkor fogbélgyulladás léphet fel, ennek terápiája a gyökérkezelés. Ilyen esetben javasoljuk az elkészült fogpótlás ideiglenes beragasztását.

#### Kényelmetlenség, ráharapásos fájdalom az első napokban

A rögzített fogpótlás beragasztását követő néhány napban előfordulhat, hogy idegennek, kényelmetlennek érzi a fogművet. Ez általában egy-két hét alatt megszűnik. Amennyiben az adaptáció nem történik meg, és a fogpótlás viselése kényelmetlenséget okoz, korrekcióra van szükség.

#### Esztétikai kifogások

Az esztétika egy szubjektív fogalom, ezért a félreértésekért leggyakrabban a betegek túlzott elvárásai, illetve a kiinduló állapot, az adottságok figyelmen kívül hagyása a felelős. A fogorvos és a fogtechnikus csak bizonyos korlátokon belül tudja egyedivé tenni a fogpótlást. Az esztétikai kifogásokat a mattpróba elvégzéséig tudjuk módosítani, utána már nem!

#### A híd törése vagy a porcelán lepattanása

Az ilyen típusú probléma a következő okok miatt jelentkezhet:

- nem megfelelő használat, pl. kemény tárgyak (ceruza) vagy kemény ételek (porc, csont, pirítós stb.) gyakori rágása
- a fogakat vagy az arcot ért ütés vagy a fogsorok erőteljes összekoccanása (baleset, sport stb.)
- túlterhelés, amelynek leggyakoribb oka a fogcsikorgatás, ritkábban a kompromisszumos tervezés

Gyakori, hogy a viselés közben a különböző hatásokra láthatatlan repedések keletkeznek a pótlásban és a törés vagy a porcelán lepattanása később látszólag ok nélkül következik be.

#### Használati utasítás

A fogpótlás élettartama nagymértékben attól függ, hogyan tisztítják. Rendszeres (napi 3x) fogmosás mellett szükséges a fogak között fogselyem, szájuhany vagy egy speciális fogkefe használata! Fontos, hogy a híd alatt ne maradjon ételmaradék! Kérje a száj-higiénikusunk segítségét, aki minden eszköz használatát megtanítja. Elhanyagolt fogpótlások súlyos következményekkel járnak, tartós ínnyulladást, illetve a fogak, pillérfogak elvesztését is okozhatják!

**FONTOS! A fogpótlások is időközönként cseréire szorulnak. Az éves ellenőrzések alkalmával (ami a garancia feltétele is) a fogorvos ellenőrzi a széli záródást, az íny állapotát és, ha szükséges javaslatot tesz a fogpótlás cseréjére.**

Alulírott:....., szül. idő:.....

lakcím:.....

**A fentieket elolvasva teljes körű tájékoztatást kaptam, tudomásul veszem, egyetértek és beleegyezem.**

Dátum

Aláírás